

Dovenetel (*Lamium*)

ALGEMENE SLEUTEL

- Plant **eenjarig**, 10-30 cm hoog; bloemkroon 10-20 mm, met rechte buis
 - + Bovenste bladen zittend, stengelomvattend, schotelvormig
 - + Bovenste bladen kort gesteeld:
 - Bovenkant paars aangelopen; bladen ondiep ingesneden
 - Bovenkant niet paars; bladen 1/5-1/3 diep ingesneden
- Plant **overblijvend**; bloemkroon 20-35 mm, met gebogen buis
 - + Bloemkroon wit
 - + Bloemkroon licht purper
 - + Bloemkroon geel, effen bladeren
 - + Bloemkroon geel, bladeren met zilveren vlekken

Hoenderbeet

Paarse dovenetel

Ingesneden dovenetel

Witte dovenetel

Gevlekte dovenetel

Gele dovenetel

Bonte gele dovenetel

Dovenetel (*Lamium*)

- Eénjarig

Hoenderbeet (*Lamium amplexicaule*)

- Plant eenjarig, 10-30 cm hoog
- bloemkroon 10-20 mm, met rechte buis
- Bovenste bladen zittend, stengelomvattend, schotelvormig



Dovenetel (*Lamium*)

- Eénjarig

Paarse dovenetel

(*Lamium purpureum*)

Bovenkant paars aangelopen;
bladen ondiep ingesneden



Ingesneden dovenetel

(*Lamium hybridum*)

Bovenkant niet paars aangelopen;
bladen 1/5 – 1/3 diep ingesneden



Dovenetel (*Lamium*)

- Meerjarig

bloemkroon 20-35 mm, met gebogen buis

Witte dovenetel

(*Lamium album*)

bloemkroon wit



Gevlekte dovenetel

(*Lamium maculatum*)

bloemkroon licht purper



Dovenetel (*Lamium*)

- **Meerjarig**

bloemkroon 20-35 mm, met gebogen buis

Gele dovenetel

(*Lamium galeobdolon*)

bloemkroon geel, effen bladeren



© Dirk Smets 05-2010

Bonte gele dovenetel

(*Lamium galeobdolon ssp. argentatum*)

bloemkroon geel, bladeren met zilveren vlekken



© Dirk Smets 04-2012

Hoenderbeet (*Lamium amplexicaule*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Schutbladen stengelomvattend aaneensluitend (behalve soms de onderste).

Kelk tijdens de bloei 5-7 mm lang, de kelktanden korter dan of even lang als de kelkbuis; kelktanden na de bloei rechtopstaand of samenleidend.

Onderlip van de bloemkroon 1,5-2,5 mm lang.

Hoogte bloeiende plant

10 - 30 cm.

Bloeitijd

April - september

Levensvorm

Therofyt (eenjarig, zonder winterknoppen)


Standplaats

Bouwland, vooral op leem en mergel, wegbermen, oude muren.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	1
●	1971-'94	277	277
●	1995 - ...	27	27



Paarse dovenetel (*Lamium purpureum*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bladen regelmatig gekarteld.

Hogere stengelbladen (de onderste schutbladen niet meegerekend)

langer dan breed, eirond of ruitvormig.

Kelk 0,5-0,75 mm lang, de tanden meestal ongeveer even lang als de buis. Bloemkroon 1-2 cm lang, lichtpaars of soms wit, van binnen met of zonder haarring.

Hoogte bloeiende plant

10 - 40 cm.

Bloeitijd

Maart - september

Levensvorm

Therofyt (eenjarig, zonder winterknoppen)


Standplaats

Bouwland, vooral hakvruchtakkers, wegbermen, heggen nabij woningen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	2	2
●	1971-'94	844	844
●	1995 - ...	288	288



Ingesneden dovenetel (*Lamium hybridum*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bladen onregelmatig gekarteld tot gelobd, om de 2 of 3 tanden dieper ingesneden.

Bloemkroon van binnen zonder haarring.

Hogere stengelbladen (de onderste schutbladen niet meegerekend) langer dan breed, eirond of ruitvormig.

Kelk 0,5-0,75 mm lang, de tanden meestal ongeveer even lang als de buis.

Bloemkroon 1-2 cm lang, lichtpaars of soms wit, van binnen met of zonder haarring.



Hoogte bloeiende plant

8 - 25 cm.

Bloeitijd

April - juni

Levensvorm

Therofyt (eenjarig, zonder winterknoppen)

Standplaats

Bouwland, vooral op lemige zandbodem.

Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	9	9
●	1995 - ...	3	3



Witte dovenetel (*Lamium album*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bloemkroon roomwit, zeer zelden lichtroze; de onderlip groengeel gevlekt.

Haarring in de kroonbuis scheef opstijgend.

Stuifmeel bleekgeel.

Bladen groen, ongevlekt.

Hoogte bloeiende plant

20 – 60 cm.

Bloeitijd

April - juni

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond),


Standplaats

Taluds, heggen, wegbermen, nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	5	5
●	1971-'94	901	901
●	1995 - ...	345	345



Gevlekte dovenetel (*Lamium maculatum*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bloemkroon paarsrood, zelden zuiverwit of zalmroze; de onderlip donker gevlekt.

Haarring in de kroonbuis overdwars lopend.

Stuifmeel oranje.

Bladen groen of min of meer gevlekt, al of niet met witte middenstreep.

Hoogte bloeiende plant

25 - 75 cm.

Bloeitijd

april – juni en september (- oktober)

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond),

Standplaats

Rivieroeveren, heggen, vochtige taluds, elzenbossen, vooral in de dalen; min of meer nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	39	39
●	1995 - ...	16	16



Gele dovenetel (*Lamium galeobdolon*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Plant (meestal) met uitlopers.

Bloemkroon geel met bruine vlekken op de onderlip; de onderlip met 3 vrijwel gelijke, spitse slippen.

Onderste bladen lang gesteeld, rondachtig tot langwerpig, met afgeknotte of iets hartvormige voet, stomp, dubbel gekarteld, de bovenste korter gesteeld of zittend, eirond tot langwerpig, spits, gekarteld-gezaagd.

Kroonbuis iets gekromd, van binnen met een schuine haarring.

Bladeren ongevekt of met verspreide (tijdelijke) kleine witte vlekken.

Rijpe kelk 8 - 12,5 mm lang.

Hoogte bloeiende plant

15 - 60 cm.

Bloeitijd

April - juni

Levensvorm

Kruidchamaeyt (winterknoppen boven de grond).


Standplaats

Bossen met niet of zwak zure humus, kapvlakten, vochtige taluds.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	213	213
●	1995 - ...	57	57



Bonte gele dovenetel (*Lamium galeobdolon* ssp. *argentatum*)

Familie

lipbloemenfamilie (*Lamiaceae*)

Diagnostische kenmerken

Plant (meestal) met uitlopers. Bloemkroon geel met bruine vlekken op de onderlip; de onderlip met 3 vrijwel gelijke, spitse slippen. Onderste bladen lang gesteeld, rondachtig tot langwerpig, met afgeknotte of iets hartvormige voet, stomp, dubbel gekarteld, de bovenste korter gesteeld of zittend, eirond tot langwerpig, spits, gekarteld-gezaagd.

Kroonbuis iets gekromd, van binnen met een schuine haarring.

Bladen vooral in het topdeel met vele vrij grote (blijvende) witte of zilverige, vaak onderling aansluitende vlekken.

Rijpe kelk 12 - 14,5 mm lang.

Hoogte bloeiende plant

20 - 60 cm.

Bloeitijd

April - juni

Levensvorm

Chamaeyt (knoppen boven de grond)

Standplaats

Is als sierplant uit tuinen ontsnapt: randen van ruderaal bossen, schaduwrijke wegbermen en heggen; breidt zich uit.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	41	41

